

醫心方卷第二十五

從五位下行鐵博士夏丹波介丹波宿禰康賴撰

小兒方例第一

小兒新生祝術第二

小兒去衝血方第三

小兒與月草湯方第四

小兒與朱蜜方第五

小兒與牛黃方第六

小兒與乳方第七

小兒哺穀方第八

小兒初浴方第九

小兒新瘡方第十

醫心方卷第二十五

從五位下行鐵博士夏丹波介丹波宿祢康賴撰

小兒方例第一

小兒新生祝術第二

小兒去衝血方第三

小兒與甘草湯方第四

小兒與朱蜜方第五

小兒與牛黃方第六

小兒與乳方第七

小兒哺穀方第八

小兒初浴方第九

小兒新瘡方第十

小兒去鴉口方第十一

小兒新連舌方第十二

小兒刺懸癰方第十三

小兒變逆法第十四

小兒擇乳母方第十五

小兒為名字方第十六

小兒初看衣方第十七

小兒調養方第十八

小兒禁食方第十九

治小兒解顙方第二十

治小兒亞陷方第二十一

治小兒搖頭方第二十二

治小兒發下生方第二十三

治小兒白朱丸方第二十四

治小兒頭瘡方第二十五

治小兒鬼鼓頭方第二十六

治小兒身面瘡方第二十七

治小兒面背瘡方第二十八

治小兒耳聾方第二十九

治小兒耳瘡方第三十

治小兒聾耳方第三十一

治小兒耳百虫入方第三十二

治小兒耳蟻入方第三十三

治小兒耳臭方第三十四

治小兒耳蚰蛇入方第三十五

治小兒目不明方第三十六

治小兒目赤痛方第三十七

治小兒眼眵爛痛方第三十八

治小兒眼翳方第三十九

治小兒雀盲方第四十

治小兒目眩方第四十一

治小兒目竹木刺方第四十二

治小兒目莖草沙石入方第四十三

治小兒眼為物撞方第四十四

治小兒瞽口方第四十五

治小兒口瘡方第四十六

治小兒口下黃肥瘡方第四十七

治小兒唇瘡方第四十八

治小兒緊唇方第四十九

治小兒口紫方第五十

治小兒重舌方第五十一

治小兒舌上瘡方第五十二

治小兒舌腫方第五十三

治小兒雀盲方第卅

治小兒目眩方第卅一

治小兒目竹木刺方第卅二

治小兒目生草沙衣方第卅三

治小兒眼為物撞方第卅四

治小兒驚口方第卅五

治小兒口瘡方第卅六

治小兒口下黃肌瘡方第卅七

治小兒唇瘡方第卅八

治小兒唇緊唇方第卅九

治小兒口紫方第五十

治小兒重舌方第五十一

治小兒舌上瘡方第五十二

治小兒舌腫方第五十三

治小兒齒脫生方第五十四

治小兒齒落復不生方第五十五

治小兒齒間出血方第五十六

治小兒鼻血方第五十七

治小兒鼻塞方第五十八

治小兒鼻息定方第五十九

治小兒喉痹方第六十

治小兒喉方第六十一

治小兒津頤方第六十二

治小兒吐乳方第六十三

治小兒雞乳方第六十四

治小兒風不乳哺方第六十五

治小兒齋不合方第六十六

治小兒齋中付吐方第六十七

治小兒齋赤腫方第六十八

治小兒齋瘡方第六十九

治小兒腹痛方第七十

治小兒腹脹方第七十一

治小兒疳病方第七十二

治小兒瘰癧方第七十三

治小兒疔癰方第七十四

治小兒五癰方第七十五

治小兒腹中有虫方第七十六

治小兒陰腫方第七十七

治小兒陰痛方第七十八

治小兒陰瘡方第七十九

治小兒下血方第八十

治小兒陰囊腫方第八十一

治小兒陰頰方第八十二

治小兒吳頰方第八十三

治小兒脫肛方第八十四

治小兒穀道瘡方第八十五

治小兒穀道瘡方第八十六

治小兒穀道瘡方第八十七

治小兒疳疔方第八十八

治小兒痼病方第八十九

治小兒疳病方第九十

治小兒容疔方第九十一

治小兒夜啼方第九十二

治小兒驚風方第九十三

治小兒驚風方第九十四

治小兒驚風方第九十五

治小兒陰頰方第百十二

治小兒吳頰方第百十三

治小兒脫肛方第百十四

治小兒穀道瘡方第百十五

治小兒穀道瘡方第百十六

治小兒口退方第百十七

治小兒口白方第百十八

治小兒痲病方第百十九

治小兒魘病方第百二十

治小兒容忤方第百二十一

治小兒夜啼方第百二十一

治小兒驚悸方第百二十三

治小兒羈啼方第百二十四

治小兒驚病方第百二十五

治小兒傷寒方第百二十六

治小兒卒死方第百二十七

治小兒淫病方第百二十八

治小兒數歲不行方第百二十九

治小兒四五歲不語方第百三十

治小兒元氣方第百三十一

治小兒大腹疝方第百三十二

治小兒霍亂方第百三十三

治小兒泄利方第百三十四

治小兒白利方第百三十五

治小兒赤利方第百三十六

治小兒赤白痢下方第百三十七

治小兒血利方第百三十八

治小兒大便不通方第百三十九

治小兒小便不通方第百四十

治小兒大便血方第百四十一

治小兒小便血方第百四十二

治小兒淋病方第百四十三

治小兒遺尿方第百四十四

治小兒身黃方第百四十五

治小兒赤瘡方第百四十六

治小兒腹脹青黑方第百四十七

治小兒赤瘡方第百四十八

治小兒瘰癧方第百四十九

治小兒疣目方第百四十九

治小兒身上癩方第百五十一

治小兒身癢方第百五十二

治小兒盜汗方第百五十三

治小兒隱疹方第百五十四

治小兒丹瘡方第百五十五

治小兒赤遊腫方第百五十六

治小兒身腫方第百五十七

治小兒惡核腫方第百五十八

治小兒瘰癧方第百五十九

治小兒諸瘡方第百六十

治小兒瘰癧方第百六十一

治小兒附骨疽方第百六十二

治小兒癰疽方第百六十三

治小兒代指方第百六十四

治小兒疥瘡方第百六十五

治小兒癰瘡方第百六十六

治小兒浸淫瘡方第百六十七

治小兒隱疹方第百廿四

治小兒丹瘡方第百廿五

治小兒赤遊腫方第百廿六

治小兒身胖腫方第百廿七

治小兒惡核腫方第百廿八

治小兒瘰癧方第百廿九

治小兒諸瘰方第百廿九

治小兒瘰癧方第百三十

治小兒附骨疽方第百三十

治小兒癰疽方第百三十一

治小兒代指方第百三十四

治小兒疥瘡方第百三十五

治小兒癰瘡方第百三十六

治小兒浸淫瘡方第百三十七

治小兒癰瘡方第百三十八

治小兒王灼瘡方第百三十九

治小兒月蝕瘡方第百四十

治小兒凍瘡方第百四十

治小兒條瘡方第百四十二

治小兒癰瘡方第百四十三

治小兒惡瘡方第百四十四

治小兒金創方第百四十五

治小兒湯火灼瘡方第百四十六

治小兒竹木刺方第百四十七

治小兒落床方第百四十八

治小兒食不飽方第百四十九

治小兒吐食方第百五十

治小兒吐血方第百五十一

治小兒咳嗽方第百五十二

治小兒食食骨瘦方第百五十三

治小兒食肉骨瘦方第百五十四

治小兒食草芥瘦方第百五十五

治小兒飲水極難方第百五十六

治小兒食食段繞咽方第百五十七

治小兒誤吞錢方第百五十八

治小兒誤吞針方第百五十九

治小兒誤吞物方第百六十

治小兒誤吞艾方第百六十一

治小兒誤吞銀方第百六十二

治小兒誤吞竹木方第百六十三

小兒方例第一

小品方云黃帝云人年六歲以上為小十八以上為少女以上為壯
以上為老也其六歲以前者經所不載是以乳下嬰兒病難
治者皆无所求也中古有巫斯立小兒顱窻經以古文壽刺
疾死生在相傳有少小可焉

今案大素經云小兒初生為嬰能哭為孩脈

經義解云小兒初生身長一尺一寸重十斤

產經云凡兒生當長一尺一寸重十斤

小兒方云黃帝人年六歲以上為小十八歲以上為少廿二歲以上為壯
以上為老也其六歲以前者經所不載是以乳下嬰兒病難
治者皆无所求也中古有巫彭巫小兒顓臾經以古文壽
疾死生相傳有少小可焉

今案大素經云小兒初生為嬰能哭為厥脈

經義解云小兒初生身赤子

產經云凡兒生當長一尺一寸重十五斤

針灸經云十歲小兒七十老人不得針足及背

千金方云凡新生兒七日以上周年以還不過七壯壯如雀矢大

小兒新生祝術第二

產經云凡兒初生時即祝曰天為父地為母領金錢九十

九令兒壽

凡小兒初生仍以菽其手掌曰考理壽千歲至二千石乃起

之大吉若可當為天子王侯活紀卿相者而隨其相若

之乃可起檢之吉

小兒去衝血方第三

產經云兒初生落地急撻去中台上衝血即時不去須

史血潔兒驚哭驚風也腹中百病以手撻去之

千金方云兒生口中有血即當去之不去者而得吞之或病

小兒與甘草湯方第四

千金方云兒新生出腹先以指新口中惡一去之便以浴新

解袍託去朱家也取甘草如半寸指一節計行碎末

二合煮取一合以綿纏沾取與兒吮之如朱蜜法連吮計可

得一蜺殼入腹心兒當快吐云胃中惡汁也吐後信見

飢渴項復更與之若前服及更與並不吐者但稍與盡

此一合心得吐思付令兒心神智慧无病都不吐者是不

含唇血耳勿復與之上品方同之

小兒與朱蜜方第五

產經云小兒初生三日可與朱蜜方令兒鎮精神魂魄真朱精

二合煮取一合以綿纏沾取與兒吮之如朱蜜法連吮計可
得一蜆殼入腹心兒當快吐云胃中惡汁也吐後信見
飢渴項復更與之若前服及更與並不吐者但稍與盡
此一合止得吐惡汁令兒心神智慧无病都不吐者是不
含惡血耳勿復與之上品方同之

小兒與朱蜜方第五

產經云小兒初生三日可與朱蜜方令兒鎮精神魂魄真朱精
煉研者如大豆多以赤蜜一鹽殼和之以綿纏沾取與兒吮之
得三帖止一日令盡此一豆多耳作三日與之則用三大豆多也
勿過此量過則復兒也

今案小兒方云不宜多則令兒脾胃冷腹脹

小兒與牛黃方第六

產經云朱蜜與黃可與牛黃益肝膽除痰定驚
辟惡氣也作法如朱蜜多少一法同也上品方同之

小兒初與方第七

產經云凡乳兒女當枕臂與乳頭平膏乳不然則令兒嗜
乳乳兒當先施去宿乳以乳兒之不然令兒吐乳可利
兒先以手按乳令散其熱乃乳兒之若不然乳汁奔走於
兒咽令兒棄乳成疾也

凡乳兒母欲寐者則棄其乳恐覆兒口鼻兒不知飽令致
兒困也

凡乳兒煩不欲大飽則令兒吐乳若吐乳者當以空
乳之則消復不去熱乳以乳令兒飲送冬不去寒乳令
兒哭下利

凡母新乳以乳令兒常熱腹滿

母新內以乳令兒羸弱胎不能行致兒

母新以乳令兒身熱腹滿致兒

母新以乳令兒喜發氣病

凡乳兒不食大飽則令兒吐乳者當以空乳之則消復不去乳以乳令兒飽送冬不去寒乳令兒哭下利

凡母新飽乳令兒常熱腹滿

母新內以乳令兒氣喘不能行效兒

母新以乳令兒身熱腹滿效兒

母新以乳令兒喜笑氣喘病

母有乳以乳令兒變黃不能食

母有疾行以乳令兒病痰狂

母新吐下以乳令兒虛羸

凡乳初生乳母食猪雞雞實胞以乳兒者令兒傷善

凡乳母過醉及房室常息乳兒者此最為劇能致兒宜慎之

夫五情善惡七神所稟无非乳哺而生化者也所以乳兒

宜能慎之其乳母黃齒黑齒目大炸聲眼精渴者多淫

邪相也其推頂高鼻長口大臂胫多毛者心不悅相

也其手足醜惡皮厚骨強齒齙口鼻色赤如絳者勝

男相也其身軀短令元有潤澤皮膚光肌而瘦癯

者多病相也

又有偏腋偏也胡光白亮癰疽者諸瘡瘰癧瘰癧

癰疽者鼻龍耳耳者齒齙者生瘰癧瘰癧

瘰癧瘰癧瘰癧者是醜疾相也

又其本命生年與兒无刻如此諸惡相者後可飲乳

不隨此法害兒不吉

凡乳兒頃欲大飽則令兒吐乳

小兒哺養方第八

產經云凡小兒生三日後應開腹助穀神可研米作

飲如乳酪狀抄如大豆粒大与兒咽之咽三五許止日三

与之七日可与哺十日始哺如來挾許廿日倍之五十

日哺之

不隨此法皆與不吉

凡乳兒頓飲大飽則令兒吐乳

小兒哺養方第八

產經云凡小兒生三日後應開腹助穀神可研米作
飲如乳酪狀抄如大豆粒大與兒咽之咽三豆許止日三
與之七日可與哺十日始哺如來扶許廿日倍之五十
日如彈丸許百日如米許若乳汁少者不從此法當
用意少哺之

今案本草云以如梧子十六枚唯

彈丸一枚

一云廿日後可乃始哺令兒无疾也若早與哺者兒頭面
喜生瘡及令兒虛羸難長若兒大小隨宜哺哺後長
凡小兒不眷哺者勿遽與之哺不隨便致疾也

又云初哺小兒良日

五寅 五辰 五戌 五酉 皆大吉

又云男以甲乙 女以壬癸吉

又云以戌收哺宜滿日義曰保日皆吉哺兒終身无疾

吉 義曰壬子 庚辰 保日甲午 乙巳

又云哺小兒忌日

五戌 五巳 五亥 丁日大凶

又戊戌 戊辰 執用日時大吉

小兒初浴方第九

產經云小兒初生時洗浴以牛乳小置湯中令兒至老无疾

一云香脂大如指投湯中浴之 大佳香脂是半脂也

又云小兒初生以帚頭骨漬湯中洗浴之令兒不病

又云小兒初生以洗浴以金銀珍寶珠至等投湯中兒者為貴

簡得大吉

又云小兒初浴湯法桃根李根梅根三物以水煮取汁洗

浴兒却諸不祥令兒身无瘡大吉 今案千金方云以猪膽一枚投

小兒初生時

產經云小兒初生時洗浴以牛乳小置湯中令兒至老无疾

一云香脂大如指投湯中浴之
大佳香脂是半脂也

又云小兒初生以席頭骨漬湯中洗浴之令兒不病

又云小兒初生以洗浴以金銀珍寶珠至等投湯中兒必為貴

尊大吉

又云小兒初浴湯法桃根李根梅根三物以水煮取汁洗

浴兒却諸不祥令兒身无瘡大吉
今案千金方云以猪膽投湯中浴兒終身不患瘡疥

又云凡小兒浴數者令兒背脊冷致痼若久不浴者令兒

毛落急復令啼呼之間二日浴之良

又云浴小兒良日

壬寅卯申酉 又甲寅未申酉 丁酉 庚申 庚辰

皆吉令兒終身无疾病長壽大吉

又云浴小兒良日

庚戌壬子 甲子 庚辛 壬寅 庚辰 午未 辰 酉

又男壬戌日 女壬子日 大吉 又辛丑 辛酉 夜半大吉

小兒新磨方第十

產經云凡兒新磨法以銅刀新之吉磨當令長六寸長

則傷肌短則傷歲

凡兒初生當即舉之遲舉則令兒寒中腹中雷鳴先浴之

然後新磨裹之吉

千金方云新磨當令長至足夫短則中寒令腹中不調當

下利

又云裹磨法推治帛布令柔軟方四寸新綿厚半寸与

布等合之調其緩急令兒吐乳兒生廿日乃解初磨

若十日許兒終啼似衣中有刺此或磨燥遲刺其腹當

解勿衣更裹磨時當閉戶下帳燭火左右令帳中

溫暖兒衣且令溫粉之比謂冬時寒也若磨不食燒

千金方云新席當令長至足夫短則中寒令腹中不調當
下利

又云裹席法推治帛布令柔軟方四寸新綿厚半寸与
布等合之調其緩急令兒吐乳兒生廿日乃解視席
若十日許兒終啼似衣中有刺此或席燥暵刺其腹當
解勿衣更裹席時當閉戶下帳燭火左右令帳中
溫暖兒衣令溫粉之之此謂冬時寒也若席不愈燒撥

裹令成灰

未粉席中

小兒去鴿口方第十一

產經云凡初生兒口中舌上有白物如米屑名為鴿口及鼻
外之有此由兒在胞中之時其母嗜食米使之然也
此物當時不去之兒得吞者化為血也宜便去之治之方以
豉經叙頭指并花水擦拭之三四日如此便脫去也猶不去
者可煮栗樹皮用如上法皆良

一云叙頭者在者屠獲水中勿令兒口中落入吞小兒口同之
奕師方云小兒鴿口 來自什和胡粉塗之

小兒新連方第十二

產經云兒初生之時有口中舌下腫如石榴子中障者連其
舌下當時不搗斷者後喜令兒言語不發轉舌也治之方
可以以搗斷之破有血出无害若血出不止者可燒豉作末
傅之血止良 十品方名之連舌

小兒刺懸癰方第十三

產經云小兒初生後三日其血氣收斂成害則口舌類裏頰
淨也若唯裏舌上有物如盧穉穉水狀者名懸癰有
氣脹起也又有看舌下如此者名為重舌又有上脣如此
者名為重脣又有看齒齦如此者為重齦皆刺去血止

傳之血心良十品方名之連舌

小兒判懸癰方第十三

產經云小兒初生後三日其血氣收斂成害則口舌類裏頰
淨也若喉裏舌上有物如蘆穰鹹水狀者名懸癰有
氣脹起也又有看舌下如此者名為重舌又有上脣如此
者名為重脣又有看齒齦如此者為重齦皆刺去血行
之良

治奇以綿纏長針未子如粟以刺決之令氣泄之去積黃
針足一刺以之消其一日不消又刺之不過三刺自消小兒
小兒變氣第廿五

病源論云小兒變氣者以長血氣也變者上氣逆者變氣
變氣有輕重其輕者體熱而微驚耳令體之令
上脣頭白兒起如死與目珠子微行平者而歌遠者九
日乃歌遠者八九日乃歌其重者體壯熱而脈亂或行或不行不欲食

或吐或咽无所若也變氣之時目白睛微赤黑精微白之
无所苦菜畢自明了矣先變五日後五日為十日之中變乃
除耳初變之時熱甚者或連日數不歌審計日數名變

變氣服黑散行熱不止者服紫丸小兒便止勿復服
之其變氣之時遇寒加之則寒交平腹痛文稿不
以煮熨之則愈變氣與溫壯傷寒相似若非變氣身

熱耳熱體熱此乃為他病可為餘治審是變氣不
得為餘治也其變氣日數出病源論
又變氣者脣頭白完起如死與目珠子微行平者而
歌遠者九日乃歌

兒生廿二日始變者耳熱也至廿四日再變者且變
狀同歌端心也第二變氣時或目白者赤黑者微白變
至畢目便精明矣至九十六日三變者候母乳而也

也至一百廿八日四變者且變能笑也至一百廿五日五

得為餘治也其變逐日數出病源論

又變者肩頭白完赴如死冥目珠子彼行平者而
歌遠者九日乃歌

兒生廿二日始變者耳熱也至廿四日再變者且
狀同歌端心也第二變逐時或目白者赤黑者彼白變
至畢目便精明矣至九十六日三變者候母乳也而
也至一百廿八日四變者且能笑也至一百廿五日五
變以成機剛也至一百九十二日六變者且能知五機成
也至二百廿四日七變以知剛固也至二百五十六日八變
且能知學語矣至二百八十八日九變以知立也九
變三歲也至三百廿日十變者且能積三百廿日小
畢後二十日大畢後百廿日復畢積五百七十六日大
小畢畢乃成人也所以變逐者時是榮其血脈攻其
五藏故一變竟輒變情所有異者也

凡氣之候身恆契脈亂汗出目精不明微欲驚不乳
哺上脣頭小白完赴如死冥目珠子耳令尻赤令此
其証也此者五日歌遠者八九日歌也當審計其氣日
不可針灸服藥

凡兒變之時不欲驚動勿令過多人也小兒變時或耳
或脫也

凡兒生三月不遂則耳聾目昏五月不遂身不行九月
不遂五機不成此為痿癱不能行之疾也
產後云脈決曰凡小兒變逐之時行出不用食輒吐乳
而脈亂无可若也

葛氏方云凡小兒生後二十日目瞳子成能笑識人百五
日任脈生能及度百八十日尻骨成能獨坐二百一十
日骨成能匍匐三百日髓骨成能獨倚三百六
日為一晷膝骨成能乃能行

不至五株不成此為痿癱不能行之疾也
產後之脈決曰凡小兒變星之時行不用食輒吐乳
而脈亂无可若也

葛氏方云凡小兒生後二十日目瞳子成能吮乳識人百五
日任脈生能及處百八十日尻骨成能獨坐二百一十日
掌骨成能匍匐三百日髓骨成能獨倚三百一十
日為一晷膝骨成乃能行

治小兒初變星時有者服之效于已心黑散方

杏仁二分 大黃一分 麻黃二兩 去節

右三物先搗大黃麻黃下篩杏仁令如脂內散令調更
廉蔞之咸以專裏廿日兒以汁和之如小豆一九分

凡易吞厚衣范之令行一出畢下張越火解不溫粉
之百日兒取散如來板大以小陽和服之汗出之後

消息如上法當服溫粉不可解衣乃溫粉

治已服黑散發熱不歇服之熱小兒便止勿復與紫丸方

赤石脂一兩 巴豆廿粒 代赭一兩 炙甘草 一兩

右四物先治已豆杏仁搗三千杵乃內代赭赤石脂更

搗三千杵絕也藥熟即成一方云相和与少蜜和之

盛以蜜器无令藥燥則无熱以巴豆杏仁自丸常若

能盡屑當稍內之令相九廿日兒服如黍米一九

乳之令藥得下却而食頃乃復乳之分令

飽耳平且一服藥日中熱盡日西夕時復小增丸

至雞鳴時若復与一九愈者止廿日兒服如大黍

米一九廿日兒服如麻子一九六七十日兒如胡豆一九百

兒服如小豆一九不下故熱者增半丸以下利為度

天寸說服紫丸當須完出若不出不完為病未盡當

更服之有熱乃服紫丸无熱但有寒者熱服乳頭

小兒乳之令導得下去而食乳乃後乳之令

飽耳平且一服藥日中熱盡日西夕時復小增丸

至雞鳴時若復与一丸愈者七廿日兒服如大黍

米一丸卅日兒服如麻子一九六七十日兒如胡豆一丸百

兒服如小豆一丸不下故熱者增半丸以下利為度

又寸說服紫丸當傾完出若不出不完為病未盡當

更服之有熱乃服紫丸无熱但有寒者熱服乳頭

單當歸散黃耆散變永服藥後發熱者急可与陸

黃苓湯方生滑澤可

黃苓湯少小軍變永時服藥下後有朝又熱利除熱可

黃苓兩 月皮六兩 人參兩 干黃六兩 甘草兩

大棗五枚去核

凡六物切之以水三升煮取一升分三服二日兒服半

合三百日兒服一合日并熱者止變永兒有發熱下利

又方經曰天不足西北故令兒腮後合地不足東南故兒

後生成人法於三故令齒後故腮合乃而言體成乃而行

大陰氣不足而大陽氣有餘者故令兒羸瘦骸脰三

歲乃而行

擇乳母方第十五備在第七小兒與乳子未

小品方云乳母者其血氣為乳汁也五情善惡血氣所

生也乳兒者待宜慎喜怒夫乳母形色所宜其後甚多不可

悉得今但令不利鼻癭痛腫癭氣味蝸蚘癰瘡白

禿癰傷瘰癧耳聾鼻臭瘰癧无此等病者便

可飲兒也師見其故多盤便知其二傷原也

小兒為名字法第十六

產經云

子日生名救一名壽 丑日生名帶一名徐 寅日生名令一名阿

卯日生名官一名金 辰日生名道一名片 巳日生名孟一名

午日生名徐一名阿 未日生名護一名 申日生名多一名 酉日生名

禿癰傷瘻瘻耳聾鼻癰眼无此等病者便
可飲兒也師見其故多盤便知其二傷原也

小兒為名字法第十六

產經云

子日生名救一名壽丑日生名帶一名徐寅日生名令一名阿

卯日生名官一名金辰日生名道一名片巳日生名蓋一名

午日生名徐一名阿師未日生名護一名申日生名多一名趙

酉日生名多一名弟戌日生名他人一名侶

又云正月一日十日廿日宣日宣時生子名為正月子二月二日十日

廿二日卯日卯時生子為二月子五月五日十五日廿五日午日午時

生子名為五月子七月十七日廿七日申日申時生子名為

七月子諸此日月合生者可為名耳

又云以二月五月生者皆不利父母二月生男名女都生女

名惟女一名定女無咎五月生男名連快一名枝紆女名

將華未如此名之元咎是周文王為作神字不好害父書

又云初立名字勿以五子日凶又不以巳日大凶

小兒初看衣方第十七

產經云小兒初看衣法甲子日生子衣以黑衣忌度日

丙子日生子衣以青衣忌度日戊子日生子衣以綠衣忌度日

庚子日生子衣以黃衣忌度日壬子日生子衣以白衣忌度日

又云小兒初看衣良日辰巳男以甲女以乙吉

又云凡作兒衣勿以新綿縐之損兒氣故宜用故布帛

有人氣者看益也兒衣不欲厚多綿之恒如不厚兒其

寒乃為佳耳

小兒調養方第十八

禮記云童子不衣裘裘裘大溫消陰氣使不堪苦不衣裘以便

養生要集云嬰兒之生衣之新縐則骨肉退焉食之集

肉則虫生焉串之徒樂則易傷焉

又云凡作兒衣勿以新綿繒之損兒氣故宜用故布帛
有人氣者看益也兒衣不欲厚多綿之恒如不見其
寒乃為佳耳

小兒調養方第十八

禮記云童子不衣裘

裘大溫消陰氣使不堪苦不衣裘以便

養生要集云嬰兒之生衣之新繒則骨柔焉食之集
肉則虫生焉串之逐樂則易傷焉

千金方云小兒始生肌膚未成不可暖衣一一則令筋
骨緩弱不見日風則令肌膚脆軟便易傷皆當以故
絮暑衣之勿用新綿也天和暖无風寒之時令母將於
日中嬉戲數見風日則血氣壯野肌肉牢密耐風寒
不致疾病若常處在帳中重衣溫暖辟陰地之草
不見風日軟脆不堪風寒

又云養小兒常慎驚勿令聞大聲托持之間當安徐
勿令怖也

又云天雷塞耳但作餘細聲以亂之

又云凡兒冬不可浴冬生傷寒夏不可浴不浴久傷熱
又云凡兒不能乳哺當雙乳下之小兒氣盛有二病但下之
必无所損若不時下則成疳固難治矣

病源論云薄衣之法當從秋習之不可以春夏平減其
衣則令中寒從秋習之以漸猶寒如此則冬月但
當著兩薄襦一複裳耳常令不忍見其寒適佳耳
愛而臠之過所以害之也

又云當消息无令行出則致虛損便受風寒晝夜寤
寐皆當慎之

產經云凡養小兒法随大人身之寒溫而養之随天時寒
溫減增之能察其微之又不用新綿帛新者過昂有
患兒故也

當着兩薄襖一複裳耳常令不忍見其寒適佳耳
受而臍之過所以害之也

又云當消息无令行出、則致虛損便受風寒晝夜寤寐皆當慎之

產經云凡養小兒法随大人身之寒温而養之随天時寒温增减之能察其微之又不用新綿帛新者過昂有患兒故也

凡小兒衣其寒薄者則腹中乳食不消、則其大行解、是此故為一解之術也便將雙丸以微消之

凡小兒大行黃而晁者此是腹中有熱故宜將服龍骨湯良

凡小兒不節哺乳者則病易後下之則傷胃氣令腹脹滿再三下尚可過此則傷小兒矣

凡小兒冬月下為无所畏夏月下不寒難治恒有疾者不可不下夏月下之後腹中常當小脹滿故當節哺乳將護之數日自愈矣

凡小兒不使溺竈上令兒陰生瘡難治

小兒禁食第九

產經云小兒食諸害令兒腹中生瘕難治

又云小兒齒未易蜜及粉糖不可与食令兒齒朽壞難易齒不堅

又云小兒不可与食物鼠殘物令兒咽中生白瘡死

又云小兒不可与食板木皮諸藥令兒生寒熱及瘰癧

養生要集云大豆炒小麦勿与一歲以上十歲以下小兒喜食壅而死也

又云凡男子年十五以下不得飲水沉將腰膝理未成故成病又云小兒未断乳不可啖鷄肉生魷魚之令躄瘦

崔禹錫食經云大麦麵勿与一歲以上十歲以下小兒其毒氣

雍古寒而死

又云小兒不可与食板未成諸藥今現生寒熱及癰癰
養生要集云大豆炒小麦勿与一歲以上十歲以下小兒喜氣壅
而死也

又云凡男子年十五以下不得飲水飢將騰理未成故成病
又云小兒未断乳不可啖鷄肉生就生之令躰瘦

崔氏錫食經云大麦麵勿与一歲以上十歲以下小兒其喜氣
壅^寒寒而死

孟詵食經云黍不可与小兒食之不能行
又云小兒食蕒菜便覺脚痛

獲敬本草注云粟^粟解孩兒令齒不生
本草拾遺云知小兒食之脚屈不能行

又云小兒食蕒脚弱不行
治小兒解額方第廿

病源論云解額者其狀小兒年大亞應合額縫^而解是也
由腎氣不成故也腎主骨髓而腦為髓海腎氣不成

則髓腦不足不能結成
產後論云細辛一分 桂心一分 干薑五升

凡三物以乳汁和塗上下復塗
僧深方云取猪牙車骨髓塗上下日二十日

小品方云生蟹膏 白蝨各二升
凡二物下煎以乳汁和塗上立愈

千金方云熟地脫末和猪類車中髓塗上下日三四
葛氏方燒驚藥末傳良

極要方云防風^白 白芨 栢子人 各二升
右為散以乳汁塗患上日一十日和廿日合

又方灸瘰上下半寸^{新錄方}
治小兒胎胎方第廿一

病源論云小兒胎胎上胎此謂胎胎下不平也由腹內有熱

千金方云救馳脫未和猪類中髓塗上日三四
葛氏方燒驚藥末傳良

極要方云防風白及栢子人各二

右為散以乳汁塗患上日一十日和廿日合

又方桑癭上下半寸公新錄可

治小兒胎前方第廿一

病源論云小兒胎前此謂胎前下不平也由腹內有熱

氣壅藏熱則渴引飲而小兒泄利者則府藏血氣虛弱不

能上充髓腦故胎前也

千金方云桑癭上下各半寸及桑子六陰各一壯

今案五遺付經云足大陰穴在內踝後白肉際陷骨宛中

治小兒搖頭方第廿二

子母秘錄云治小兒長搖頭方 物腦以摩頭即差

治小兒駝背方第廿三

病源論云小兒稟生足少陰之血氣不足則駝背不生

足有目頭創而充落不生

小品方椒葉中无多少得使取付塗頭上產後用之

新錄方云以蜜和猪毛灰塗之即生

又方蓮子草付塗之驗

又方桑上寄生付塗之生

千金方云蜀椒根搗作末和鴈月猪脂付和酥之佳

治小兒白秃方第廿四

病源論云白秃之狀頭上白點斑利初似一癬而上有白皮痛

生如生瘡頭發秃落謂之白秃

葛氏方云燒解炙末以酒汁和傳之

又方未煎盡猪膏和塗之

產後之方以桑灰汁淨洗之末白焚灰和塗之良

小品方云搗椒葉中心取汁以塗頭生

治小兒白秃方第廿四

病源論云白秃之狀頭上白點斑利初似一癬而上有白皮屑生如生瘡頭發光落謂之白秃

葛氏方云燒解炙末以醬汁和傅之

又方未煎盡猪膏和塗之

產後之灸以來灰汁淨洗之末白灰灰和塗之良

小品方云搗椒菜中心取汁以塗頭立生

極要方云搗芫花以猪脂和如泥灸洗去病塗之

錄驗方云取鮫白脂傅之

千金方云不中水並煮菜燒作灰和猪脂塗之

又方亭脂子細末先洗而洗之

又方桃樹青皮搗和酢陳之

治小兒鬼故頭方第廿五

病源論云人有風邪在於頭有偏虛處那髮落肌肉枯死或如錢大或如指大髮不生故謂之鬼故頭

千金方云狸骨燒末以猪脂和塗之

產後之亂髮如鴨子大一枚解解炙一頭苦茶一兩 附子反

雄黃二兩 猪膏半

凡六物搗碎下用膏煎髮炙令盡內諸藥末按之

傳瘡上良

治小兒頭瘡方第廿六

病源論云府藏有熱氣上衝於頭而復有風濕乘之濕熱相搏折血氣血變生創

極要方云胡粉膏主之

胡粉

人代名

松脂

猪膏

名

右煎成去滓內水銀胡粉和調塗瘡上日三次人乳塗之

今案千金方云銀膏在下条

產經云梁上塵下篩麻油和先洗瘡畢拭燥傅上

病源論云府藏有熱氣上衝於頭而復有風濕乘之濕熱相搏折血氣血變生創

瘡要之胡粉膏主之

胡粉 松脂 猪膏

右煎成去滓內水銀胡粉和調塗瘡上日三次人乳塗之

今案千金方云銀膏在下条

產經云梁上塵下篩麻油和先洗瘡畢拭燥傅上

僧深方云燒竹葉和鷄子白傅之不過三食

獲教本單注云生翳胡麻淫之大効

葛氏方云雞屎燒治為末和猪脂付之

劉涓子方云取臘月猪屎燒末傅之良

經心方治小兒一切頭瘡久即血瘡不生加荊蘆黃方

黃連八分 荊蘆二分 黃蘗八分 樊石八兩

雄黃八分 松脂八分

六味以猪膏二升煎令調先以赤龍皮湯洗付之

子母秘錄云竹葉燒灰和鷄子白付之僧深方云不過三食之

范汪方治小兒頭創面赤有創日月益甚方

黃連 赤小豆熬分等作屑和猪膏塗之

千金方治小兒頭瘡經年不愈方

松脂六分 大黃四分 苦茶五分 黃連六分 胡粉四分

凡五味下篩以猪膏和研水銀散傅上

徐之才方云白帝瘡小兒頭上瘡團然白色者是也大蒜

搗白敷早朝付之

治小兒頭面身疥瘡方第廿七

病源論云府藏熱盛熱氣衝發皮膚而外有風濕折

与血氣相搏則生瘡其狀初赤起痛癢後乃生膿

汁隨差隨發或生身疥或出頭面或身疥頭面付有

之者

徐之才方云白帝瘡小兒頭上瘡腫之然白色者是大瘡
搗白殿早朝付之

治小兒頭面身躰瘡方第廿七

病源論云府藏熱盛熱氣衝發皮膚而外有風濕析
與血氣相搏則生瘡其狀初赤起瘡^瘡後乃生膿
汁隨老隨發或生身躰或出頭面或身躰頭面皆有
之者

千金方云水銀膏主之

今案核要方云胡粉膏在頭瘡条

葛氏方取兒父禪倪汁以浴之勿令兒及母知也

范汪方治小兒頭創面点有創日月益甚方

黃連 赤小豆熬令毒作屑和猪膏塗之

廣利方療小兒面上忽生瘡黃水方

黃連末三分 胡粉三分 甘草一分炙

三味以猪脂和以帛貼瘡一日一

又方鄒食一頭燒作灰^和以酒汁塗上

集驗方丹茱萸葉以東流水煮以冷良

治小兒面白屑方第廿八

產經云吳茱萸根白皮煮取汁拭洗

又方以刀廿刻穀樹取其汁塗白處上日三四

今案樊石和酒付之尤良

治小兒耳鳴方第廿九

病源論云小兒耳鳴頭眩有風令耳鳴

產經昌蒲散方

昌蒲 烏頭^{炮各}

凡二物為散以綿裹塞耳日再易

治小兒耳瘡方第卅

病源論云小兒創生於兩耳時老時叢必有膿汁是風

濕搏於血氣所生也

痼疾論云小兒耳鳴頭眩有風令耳鳴
產經昌蒲散方

昌蒲

為頭眩各

凡二物為散以綿裹塞耳日再易

治小兒耳瘡方第卅

病源論云小兒創生於兩耳時老時叢必有膿汁是風
濕搏於血氣所生也

千金方云燒馬骨灰付之

又方付鷄矢白

產經云小兒耳有惡瘡及有惡客生耳中可

雄黃六分

曾青二分 黃芩一分

凡三物合下篩以綿耳中以綿塞耳中汁出復傳良

治小兒耳方第卅一

病源論云小兒腎藏盛而有熱者熱上衝於耳津液
凝結則生膿汁亦有因沐浴水入耳內而停積搏
於血氣凝結成熱之令有膿汁皆謂之聾耳

集驗方云挑拔中人熱指末以裹塞耳常用良

効驗方云燒杏仁黃香塞耳

又方黃連

煑石

下篩如棗核吹入耳中立止

產經云搗桂末以真膏和塞耳不過三四日

又方金下灰吹入耳中令入深无苦即自出良

治小兒耳中百虫入方第卅二

產經云以苦酒灌之便出

又方油鴨灌耳中良

又方水灌之

又方煮麻子綿裹塞耳即出

又方挑菜付灌耳中

又方以草帶錐鉤向耳孔兩諸虫皆出

治小兒耳蟻入方第卅三

產經云以苦酒灌之便出

又方油酌灌耳中良

又方水灌之

又方煮麻子綿裹塞耳即出

又方批菜汁灌耳中

又方以草帶錐鉤向耳孔兩諸虫皆出

治小兒耳蟻入方第廿三

產經云桑猪膏香物入耳孔邊自出良

治小兒耳吳公入方第廿四

產經云以穀樹葉裹塩灸令煖掩耳孔令擦之即出

治小兒耳蚰蛇入方第廿五

產經云胡麻煮以葛囊枕之虫聞香即出

治小兒目不明方第廿六

尿驗方治小兒眼茫不見物方

集驗付目鯉鮒等良

治小兒目赤痛方第廿七

產經云黃連七枚

人乳汁吞

漬付之

今案極要方无乳

又方竹瀝汁三合人乳汁一合和以綿取藥拭目

又云小兒目赤淚出不止灸足大指上叢毛中名大都

葛氏方云搗薔菜取汁以注目中

尿驗方云鯉魚膽付之良

治小兒眼骨爛痒方第廿八

產經云治小兒傷風骨肉赤爛痒經年不愈青銅散方

取大銅錢一百文以好酒洗并煎錢令乾煨刮取屑下篩稍以

眼骨

治小兒眼翳方第廿九

產經云治小兒眼有翳翳大小兒年五六歲眼童子猶

不堅不宜輒付食翳散七單付冊脚散取如粟米大

治小兒眼骨爛痒方第廿八

產後之治小兒傷風骨痛赤爛痒經年不愈青銅散方

取大銅錢一百文以好酒并煎錢令乾燥刮取屑下篩稍以

眼骨

治小兒眼翳方第廿九

產後之治小兒眼有郭翳大小兒年五六歲眼童子猶

不堅不直輒付食翳散方第卅付冊取散如粟米大

內翳上一日再

又方宜單付馬珂散皆令精細好厚蜜

治小兒雀目方第卅

病源論云人有晝而精明至曉便不見物謂為雀目
言如鳥雀瞋便无所見也

千金方云至黃昏時看雀宿處打驚之雀起飛乃

兒曰紫云我還汝骨汝還我明如此三日瞋三週為之

眼明也秘法也

產後之治小兒定雀宿處夜令雀驚起之日雀目去

之如此三日即愈

又方大豆七枚和一種以二物暮向於牀它日祀之公

是甲得雀目夜无所見故欲使眼汝許与之我

護汝眼誦王通說則以和量孔口則曰我得量

圖夜能視豆穗置牀旁而赴去之如此三夕驗秘術

新錄方云鯉魚鮓魚并良

治小兒同昧方第卅一

產後之治小兒眼翳鼻孔中隨目左右以鼻翳宿之說因

目仰寤寐頃刻不復知昧處有驗

又方早赴對戶內拜跪言戶門狹小不足宿客愈之

又方吞蠶沙一枚即愈

治小兒目眇未刺方第卅二

新錄方云鯉魚鮓魚鮓付並良

治小兒同眼弟卅一

產經云以猪脂看鼻孔中隨目左右以鼻翕宿之既因目仰寤寐頃刻不復如睡處有驗

又方早赴對戶內再拜跪言戶門狹小不足宿客愈之
又方吞蠶沙一枚而吐

治小兒目竹木刺之弟卅二
產經云鮓魚二以繩貫以水煮令爛取汁灌目中即出

治小兒目生草沙石入才弟卅三
產經云研好墨以新筆注瞳子上良

又方取麥汁注目中
又方燒翹帶末服方寸匕立出

治小兒眼為物種方弟卅四
產經云炙羊完慰之勿令甚熱元羊用猪完良

又方好黃連去毛細切以人乳汁漬令黃色如大豆許
看目中作卧勿覆之甚佳

治小兒驚風方弟卅五
病源論云小兒驚風口兩吻生瘡此由脾胃有客熱上

氣煙於口兩吻生瘡目日也如驚風子之吻故名為驚口
千金方云燒錢以和猪脂塗之

又方揪白皮及區帖上四五度

治小兒口瘡方弟卅六

病源論云小兒口瘡由血氣感風將養過溫心有客
熱、煙上雖故口生瘡

產經云取烏賊魚骨燒作屑以乳汁和塗口中瘡上

葛氏方云桑白汁塗瘡上一日夜十餘過
產經云塗乳以飲

博濟安胎方以白礬石灰塗之

又方牛膝炙根筒煎含之

治兒口瘡方第廿六

病源論云小兒口瘡由血氣感風將養過溫有客
熱、煙上雖故口生瘡

產經云取有賊真骨燒作屑以乳汁和塗口中瘡上

葛氏方云桑白汁塗瘡上一日夜十餘過產經之塗乳以飲

博濟安胎方以白礬石灰塗之

又方牛膝炙根酒煎合之

推要方云取赤葵莖炙為末蜜和含之

獲敬本草注云檳榔煨作灰傅之

治小兒口下黃肌瘡方第廿七

病源論云小兒有涎壅多者其汁流溢侵漬於頤生瘡

黃汁出浸淫肥滿挾熱者創計則多

千金方云治小兒口下黃肌瘡方

熬竈上飯令煙熏未傅之

治小兒唇瘡方第廿八

葛氏方云葵根燒末付之

經心方云蟾蜍燒末付之

治小兒緊唇方第廿九

單要方云澤蘭心酒以付之

又方肉桂上搗碎之

治小兒口瘡方第卅

病源論云小兒中風口瘡者是風入頤頤項之筋故也

錄驗方云脹竹瀝汁二合分溫四服

又方桑白膏穴

儒醫方取雀矢白丸如麻子狀之即愈

千金方鹿角粉大豆末分等和塗乳飲兒

治小兒重舌方第五十一

病源論云小兒重舌者心脾熱故也其狀附舌下如舌而短故謂

葛氏方以兒暑箕中更向內中灸其舌三灸

賦驗方云服竹瀝汁二合分溫四服

又方桑白膏穴

僧侯方取雀矢白丸如麻子服之即愈

千金方鹿角粉大豕末分等和墜乳飲兒

治小兒重舌方第五十一

病源論云小兒重舌者心脾熱故也其狀附舌下如舌而短故謂

葛氏方以兒暑箕中東向內中灸箕舌三炷良

又方金月下五苦酒和傳舌下

小品方以赤小豆屑酒和傳舌上

又方燒訖數作末傳舌上良

又方用以栗哺之良

徐大山方亂帶燒灰末付之

極要方取蒲黃傳上良

又方取衣中白冥炷作屑傳舌下

產經云以銀針刺舌上腫者令血出勿刺大脉

又方燒馬扇根苦酒和墜上

治小兒舌上瘡方第五十二

病源論云小兒若心虛有熱舌上生瘡也

小品方用烏賊炙骨燒屑以雞子黃和墜喉下及舌下也

今案產經云以乳汁和墜上

又方清旦赴所來木令白汁之墜乳以飲兒

治小兒舌腫方第五十三

病源論云小兒舌腫者心脾俱熱氣鼓於口故舌腫也

千金方金月下黑末和酥墜舌上

又方滿口含糖酥少時熱氣通食

治小兒齒脫生方第五十四

病源論云齒是骨之所終而為髓之所養也小兒有稟

不足者則不能死於齒故久不生也

治小兒舌腫方第五十三

病源論云小兒舌腫者心脾俱熱氣聚於口故舌腫也

千金方金月下黑末和酥塗舌上

又方滿口含糖酥少時熱氣通食

治小兒齒脫生方第五十四

病源論云齒是骨之所終而為髓之所養也小兒有齒
則能食不足者則能食則不能死於齒骨故久不生也

葛氏方以薄蛇編繩向東磨齒處微令破即生甚神驗
樣要方唯用大二十枚以一號大杖齒處盡二十枚以廿日

齒常生

今案小品方崔嵬
失一頭大一頭小是也

獲敬本草注云人尿中竹木以心且刮之即生也

治小兒齒落不生方第五十五

產經云取牛矢中大豆二枚小肉兒口以住齒處即生
葛氏方同之

治小兒齒間出血方第五十六

范汪方取生薑治小兒齒間出血之皮血塗斷上及齒肉便愈有驗

治小兒鼻衄方第五十七

病源論云小兒經脈血氣有熱毒令鼻衄也

樣要方取香馬矢薄綿裹塞鼻中

又方燒髮作灰少許吹入鼻中

產經云阿膠令泔水煮枯額上良

又方書額上言令口血急即止

又方書額上言血出不止流入東海良

治小兒鼻塞方第五十八

病源論云小兒風冷氣入於頭腦停滯鼻肉則氣不宣

和結聚不通故鼻塞也

產經云小兒患鼻塞不通有第方

杏人二分 蜀椒一分 附子一分半 細辛一分

凡四物散以酒若酒五合煮一宿明旦以成煎猪

又方書額上言血出不止流入東海良

治小兒鼻塞方第五十八

病源論云小兒風冷氣入於頭腦停滯鼻則氣不宣和結聚不通故鼻塞也

產經云小兒患鼻塞不通有方

杏仁二分 蜀椒一分 附子一分半 細辛一分

凡四物改咀以厚苦酒五合漬一宿明旦以成灰猪肝五兩破大上藥各附子並膏成綿絮絞去滓以鹽炙中用并

又板兒頭髮寬上左右以膏摩十數週良

千金方治鼻病方恒以油塗鼻內外

又方塗藕佳

治小兒鼻息方第五十九

產經云治少小鼻息完通草散方

通草一兩 細辛一兩

凡二物下篩展綿如束被以藥如小兒者綿頸內

鼻中用二

又方樊石二兩 今藥十個方 細辛二兩云一

治小兒喉痹方第六十

病源論云小兒喉痹是風毒之氣客於咽喉之間與血氣相搏而結腫痛甚者腫塞飲粥不下乃成膜血也

產經取香扇燒灰以水腫大良

又方翫帶作繩繫頸愈

千金方 桂心二分 杏仁一兩

凡二味為散綿裹如束大咽其汁

又方煮大豆汁含之

治小兒驚方第六十一

血也

產後取膏扇燒灰以水腫大良

又方翹帶作繩繫頸愈

千金方 桂心二分 杏仁一兩

凡二味為散綿裹如束大咽其汁

又方煮大豆汁含之

治小兒驚風方第一

病後論云小兒驚風由哺乳令氣入胃與胃氣相逆令折胃氣不通則驚也

千金方云生薑汁生乳各五合二煎取五合分三服

治小兒驚風方第二

病後論云律頭之病是小兒多近驚風出債於頭下也葛氏方取東行牛口中沫塗兒口

又方楊庚用艾如豆署舌下

千金方桑白汁塗之

玄感方牛口中飼草咬付佳口中

治小兒吐乳方第三

病後論云小兒吐乳者由乳哺令熱不調故也

應驗方取桑根付着付口中即愈

又方取新牛矢水使付方飲兒大良

經心方常以空乳則肉

聖惠方治吐乳黃連一

用並根付滴豆大入中立見

又方用新熟馬屎使取付中合灌之効

治小兒難乳方第四

病後論云小兒初生血兒咽入腹令心腹否滿兒不能飲乳謂之難乳

又兒在胎之時氣入胎兒生則腹痛不肯飲乳

聖惠方治吐乳黃也

用並根汁滴豆大入中立其

又方用新契馬屎燒灰取汁半合灌之効

治小兒難乳方第六十四

病後論云小兒初生血兒咽入腹今心腹否滿兒不
能飲乳謂之難乳

又兒在胎之時氣冬一氣入胞兒生則腹痛不肯飲乳
名難乳

千金方炒鹿角末知小豆署舌下殺之與之

又方崔氏四枚末署乳頭飲之大兒十枚

治小兒風不乳哺方第六十五

鐵驗方最生竹付脹之時老兒紅腫也

博濟女農方小兒吐乳方

人參二兩 橘皮二兩 生薑二兩

以水一升半煎取八合細服之

治小兒腹不食方第六十六

千金方蜂房灰末付之

又方燒龍帶灰和膏付之

又方大車輪晒燒作灰日一付之

治小兒腹中汁出方第六十七

千金方燒蒼耳子粉之

又方燒蜂房灰敷膏中効驗方

甘草二兩 枳實一兩 下篩以粉之

又方樊石 附子各二兩 下篩敷腹中日二

治小兒腹赤腫方第六十八

千金方杏仁二分 猪類車中體二兩

凡二味先研杏仁如粉付上

治小兒腹腹方第六十九

又方燒蜂房灰敷膏中効驗方

甘草二錢 搗末 下篩以粉之

又方燒石 附子各二錢 下篩敷膏中日二

治小兒瘡赤腫方第六十八

千金方 杏仁二分 猪類車中髓二錢

凡二味先研杏仁如脂付上

治小兒瘡瘡方第六十九

病源論云小兒瘡瘡由初生新瘡後俗疥不歸
瘡退氣在瘡中遇風濕相搏故也

本草云蒿艾莖白毛付之五錢

錄驗方可用薑黃藥散粉之

產經云黃壁末全月下黑各四錢未付之

千金方小兒風瘡遂作惡瘡歷年不愈方

付東壁立大佳

又方蜂房灰未付之

葛氏方小兒風瘡及瘡瘡久不愈方

燒鼠帶作灰和乳汁傅之

又方未當歸粉之

治小兒腹痛方第七十

病源論云小兒腹痛多由冷寒之氣與藏相繫故也

不調寒熱

千金方梨葉濃煮取湯一盞七合可三四与之

又方半夏隨多^少按大蛇之末同和服如粟粒五合九

日三

治小兒腹脹方第七十一

病源論云小兒腹脹是冷氣客於藏故也

千金方云燒艾如指甲灰塗乳上飲之

又方腹上磨青葉

又方故衣帶燒指者切一升水三升煮取一升分服

又方半夏随多按火炮之半信和凡如粟粒五合丸

目三

治小兒腹脹方第七十一

病源論云小兒腹脹是令氣容於藏故也

千金方云燒艾如指甲灰塗乳上飲之

又方腹上磨青果

又方故衣帶饒垢者切一升水三升煮取一升分服

葛氏方秋及塩分等合熬令變色以磨腹上即愈

治小兒痞病方七十二

病源論云小兒胃氣熱實腹內有虫飲致令榮衛

痞塞府藏之氣不宣通其病腹內結脹滿或時作

熱是也

葛氏方云若患腹中痞結常壯熱者方

生散集血和桂屑塗上

又方未腐香脂如大豆者

又方大黃各令相火龜甲各令伏苓

凡三物分等蜜丸服如大豆一枚日三

又方枳白頭云使在囊盛以掩痞上

產經云治小兒痞面黃羸瘦丁笑不欲食不生肌膚

心中嘈煩胸茂時寒熱五藏腫脹腹中繞臍痛

常苦下八痞丸方

桂心 曾青

元伏代

牡蠣

鱧頭甲

頭積多干薑

蜀漆分細辛

龍膽分附子

凡九物治下節和如梧子服二九日三禁如藥法

本草拾遺云小兒痞三白草枳什服之令人吐

治小兒腹之癖方第七十三

病源論云五藏不和三焦不調有寒令之氣容之則令

乳哺不消化結聚成癖成瘕瘕癖結也其狀系之不

動有刑形段者瘕也推之浮移者瘕也

蜀漆分細辛

龍膽分附子

凡九物治下^節壅和如梧子服二九日三禁如藥法

本草拾遺云小兒疳三白草搗汁服之令人吐

治小兒腹^疳疳方第七十二

病原論云五藏不和三焦不調有寒令之氣容之則令

乳哺不消化結聚成^疳疳^疳結也其狀系之不

動有刑^形段者^疳也推之浮移者^疳也

千金云大兩乳下一寸三粒

又方批樹青皮搗和酥塗目二

又方苟杞根搗作末和猪脂付之和酥^三佳

醫門方搗蘇和酥^付如移餘處隨^付之驗

本草拾遺云苦瓠取末硬者煮令熟解用^付小兒^疳

治小兒米^疳方第七十四

產後^云治少小米^疳拒飲食米方

雞矢干 白朮五合

凡二物合^炒取米^堆搗末以水^升頓服取盡斯^便

吐出^痰如研米^末為^疳若元^疳而吐白痰水

增米須食米

治小兒^疳疳方第七十五

產後^云治少小食^土腹中作^五疳拒飲食^土疳方

生宗一斤以繩繫曳地行數里勿洗便^多吐之即愈

治小兒腹中有^虫方第七十六

蒼朮方治小兒腹中有^虫方

並^夷作^末每食^過多少和少^水食之乃^止

治小兒^陰腫方第七十七

病原論云小兒^下腫^熱氣衝^陰頭勿腫合^{不得}

小便乃至生^瘡俗云尿火所為也

千金方^楊益^生月^傳之

治小兒腹中有虫方第十六

蓋亮作未每食隨多少和少水食之乃止

病源論云小兒下疳契々氣衝陰々額分腫合不得

千仞方枘益望月薄之

天方書集磨石

又方楊莧菜根付之
又方發桃人主酒服方寸匕三

治小兒陰疳方第七十八

千金方云小蘇並根楊柳根各一斤

凡三味合燒以同灌之及熱以氣重之

又方甘草末和乳洗之

治小兒陰痿方第十七

產後諸病

濃煮狼牙根洗之甚良

又小兒陰頭生瘡似石榴花者亦

虎牙
犀角

凡二物刀刮以猪脂炙令變毛去淨塗上神良

千金方醫胡麻付之

又寸塞二庚甘奉未之隄上

又方黃連胡粉分等和面脂塗之

老成方耶寔中黃去未以鷄子白和付之

又方濃者煎黃蘗汁漬之

治小兒陰傷五出方第八十

產後治女小兒爲物觸傷陰道血出不止方

人頭髮并青布燒作灰以麻油和塗之亦可仍以粉良

又方蜜煎甘草末之鹽上

又方黃連胡粉分等和面脂塗之

葛代方取寬中黃去末以鷄子白和付之

又方濃煮黃蘗汁漬之

治小兒陰傷血出方第八十

產後治小兒為物觸傷陰道血出不止方

人頭髮并青布燒作灰以麻油和塗之亦可仍以粉良

又方石屎刺觸藥塗不及方

蒲黃水和脹之即止

治小兒泄囊腫方第八十一

千金方酥和麴塗之

又方金屑下土和鷄子白付之

醫門方未桂心塗良

又方未大黃和酥塗良

治小兒陰類方第八十二

病源論云類者陰核氣結腫大也小兒患此者多自啼怒
腫氣不止即於陰氣下擊法取不聚所聚也
千金方灸足厥陰大敦左右各灸七

又方三月上除日白頭公未付之一宿作瘡十日愈

產後治小兒陰頭正下上行灸頭兩極又牽下行向穀

道灸所極

小品方云小兒類方 先將兒至確頭後之口坐浴
兒其耳稱兒若七陰經灸後三七灸訖便牽小兒
其耳以下佳灸連當法以所著處灸透上七壯尋
又左右脾行灸所極皆四處隨年壯 須有驗

又方小兒騎雄軸前膺陰至額前灸有年壯

又云葛代方但灸其上又灸牽上向小腸脈

又方灸手小指頭七壯隨左右也

經心方灸兩足內踝上七寸七壯

又方但灸其上也

治小兒老類方第八十三

病源論云老類者陰核偏腫大也其偏虛者氣虛而

又方小兒騎雄軸前膺陰莖額前灸有年位

又云葛氏方但灸其上又灸莖上向小腸脉

又方灸手小指頭七壯隨左右也

經心方灸兩足內踝上七寸日七壯

又方但灸其上也

治小兒疳積方第廿三

病源論云疳積者陰板偏腫大也其偏虛者氣虛而
行故偏結腫也

千金方上卷九治小兒陰腫大如板及顏方

香豉 牡丹 防風 桂心 黃蘗 各二兩

凡五疳丸如大豆兒三歲飲五丸日三兒小者以意減之

乳頭与之

治小兒脫肛方第廿四

病源論云小兒患脫肛內出多因利大腸虛冷

驕氣故也

蘇敬本草注云燒散藥頭為灰進之

本草拾遺云有以似為藥者鵝中散藥頭脫肛皆效

傳之同編

錄驗方取鐵精粉推肉之

又方且灸龜尾骨上三七九

葛氏方熬石灰令熟故綿裹坐其上令復易之

僊保方取蒲黃一兩以猪膏和傳之不遇三愈

千金方灸頂上施毛中即入

產後生鐵三斤以水一斗煮取五升以汁洗日三次

蒜黃傳上良

治小兒穀道痔方第廿五

子母秘錄云小兒穀道生痔方

大棗取膏和檢長三寸綿裹內孔中明日出之至死

又方胡椒雄黃分等署中

千金方冬頂上施毛中入

產經云生鐵三斤以水一斗煮取五升以汁後日三乃服

菴黃傳上良

治小兒數道瘁方第八十五

子母秘錄云小兒數道至瘁方

大棗取膏和棗長三寸綿裹內孔中明日出之至死

又方胡椒雄黃分等署中

今案煮桃皮洗之者與荷把後各良

治小兒數道瘁方第八十六

葛氏方治平下部有瘡方

煮豉以漬之

又方穀汁以磨黑豆煮之

治小兒甘濕方第八十七

病源論云甘濕之病多因久利脾胃虛弱腸胃之間虫動侵食五藏使

子母秘錄云羊脂和漿水下部用猪膽之佳

又方細和胡椒塗之

又方以鐵衣署下部中師老

治小兒寸白方第八十八

小兒寸白者九蟲之內一蟲是也因府有虛弱而能發動也

病源論云食生菜一兩或又食生菜後師食乳酪之令生

葛氏方蒼朮根二斤細剉水七升煮取二升分五服又

可作糜也

今案桑之當上

又方多食極子

今案桑研胡桃人付

產經云桑皮煎去上取中白者切桑根水五升煮得三升

治小兒痢病方第八十九

病源論云小兒痢病也十歲以上為癰十歲已下為痢其

今案承之堂上
又方濃者極極
今案千金方極子九枚去皮以月旬且
又方多食極子
宜腹脹七枚七日服盡至消成水永果

今案研胡桃人付
產後三津皮煎去上取中白者切升水升煮得三升
又方研金好附子之今案子秘錄陳倉一收內乳中
又方研雄黃和酥付之攪拌子之佳

曰小兒痢病方第八十九

病源論云痢小兒病也十歲已上為癰十歲已下為痢其
發之狀或口眼相引而目睛上搖或手足掣或手足
脊搖直或頸項反折諸方諸痢名證不同大較其發
之源皆曰三種者風痢驚風食痢是也風痢
曰衣厚行出而風入為之驚風曰驚怖大降乃發
食痢曰乳哺不節所以然也小兒氣血微弱易為
傷動因此三種變作諸痢也
凡諸痢正發手足掣縮慎勿捉持之捉則令曲度不
不隨也

小品方云玄中記云天下有女身一名姑獲又名鉤皇鬼也
喜以陰雨夜過飛鳴徘徊個人村里變得素者是也是
鳥身無雄不產喜落毛羽中塵置人兒衣中便使
兒作痢病必死使化為其兒也是以小兒生十歲衣被
不可露七八月尤忌

神農本草經云小兒驚風有百種其證候異於
常

千金方云所以有痢病者皆由歲氣不平故也新
生即痢者是其五歲未收銀血氣不聚五脈不流故
又云冬之痢法憲中未合骨中隨息動者是故要慶
也 冬五也

又云頂上迴毛中臆中長關脊中毛尺澤旁官伏蹇
三里然谷穴灸之

常

千金方云所以有痼病者皆由藏氣不平故也新
生師痼者是其五藏未收斂血氣不聚五脉不流
又云冬病法宜中未合骨中隨息動者是欲要慶
也 冬五壯

又云頂上迴毛中腫中長痼瘡中毛尺澤禁官伏瘕
三里然谷穴灸之

今案明堂經伏兔穴禁灸

又云冬病當先下使兒虛乃養虛灸之未下有實而灸
者氣通前後不通致人

又云龍膽湯主之 其方在本書第五卷

廣利方按子驚病不知人迷內醫傳目方

牛黃一大豆許和蜜水服之立効

又方為犀角尖研并水二天合服之立効

枕中方取紙中白葉隨年乳和之即愈

治小兒驚風方第九十

病源論云小兒所有驚風者婦人懷妊有鬼神道其

腹中胎如蟻族而制伏他小兒令病也任娠婦不忌食

能魁人時有此耳腹之為疾喜發下寒熱有患來者

毛髮歸經不悅是其證也 驚音制

十全方冬伏翼熱驚喘之

篇第切一壯冬依切一壯以水五六升煮六七沸去滓稍

以酒之也 出新錄方

蘇敬本草注云白馬眼藤小兒驚風帶之

治小兒容忤方第九十一

病源論云小兒中容忤者是小兒神氣頗弱忽有非常

之物或是未經識見之人觸之與兒神氣相忤而發病謂

之容忤也其狀吐下青黃白色水穀解離腹痛及倒

篇集切一此冬依切一此水五六升煮六七沸去滓稍

以酒之出 出新錄

蘇敬本草注云白馬眼縣小兒題也帶之

治小兒容忤方第九十一

病匠論小兒中容忤者是小兒神氣煩弱忽有非常

之物或是未經識見之人觸之與兒神氣相忤而發病謂

之容忤也其狀吐下青黃白色水穀解離腹痛及倒

文牆面變易五色狀似痼但眼不上搖耳其脉絳數

者是也若失時不治小兒則難治若乳母飲酒過醉及

房勞後乳者最劇能斂兒也

千金方云少小所以有容忤病者是外人來氣忤之

名中人是為容忤也雖是家人或別房異戶雖是乳

父母或從外還衣服或經履鬼神厭惡黑氣牛馬之

氣皆為忤也

又云凡小兒衣布帛綿中不得有頭髮履中亦白衣青

帶青衣白帶皆令兒中忤

又云凡非常人及物從外來之驚小兒欲防之法諸有從外

來人及異物當持兒避之勿令見也若不避者燒牛天灰令

常相置戶前則善治之方

馬矢三升燒令煙絕以屑三升煮三沸去滓浴兒

又方燒女衣帶三寸并發合乳汁服之

樵要方蚯蚓尺寬中黃土等分為散水和塗兒頭上及手心

又方取銅鏡昇煙令赤看小許酒中飲之小兒又能飲金之屑愈

小品方吞腐香如大豆之合愈

又方取衣中白果十枚末以塗乳頭令兒飲之入咽即愈

葛氏方令兒仰臥以小兒暑背上燒翹散於盆中大減即愈

產怪云牛黃如大豆研飲之即効

治小兒夜啼方第九十二

病源論云小兒夜啼者藏令故也更有乳觸禁是令兒夜啼

又取銅鏡昇燈合春者小計國中代飲之小兒又能飲食之即愈

小品方吞腐香如大豆之合愈
取漿馬矢一丸注取汁飲之見下便愈
又方取衣中白果十枚末以塗乳頭令兒飲之入咽即愈

葛氏方令兒仰臥以小兒暑胃上燒翹散於乳中大減即愈
產經云牛黃如大豆研飲之即効

治小兒夜啼方第九十二

病源論云小兒夜啼者藏令故也更有乳觸禁是令兒夜啼
龍門方取鏡繫床脚即止
夜陰氣盛與冷相并則動
與清氣相搏成煩以痛令
夜啼也一平

又方書壓上作田字亮

產經真朱少許以水和塗腹上

又方取車膏著膈中

集驗方取空井中草懸戶上勿令女知

今案本草拾遺云井口邊草潛者女卧席下勿令知

玄感方取升天半許安女卧席下勿令女子俱知吉

葛氏方取犬頸下毛縫囊裏以繫兒兩手立止

又方暮取兒衣以繫柱

千金方以任身時食飲偏有所思物哺兒愈

本草拾遺云寢中玄及四文道中玄合末以飲小兒辟夜啼

治小兒驚風方第九十三

病源論云小兒驚風者是其於眠睡裏勿然啼而驚馬也

也由風熱邪氣乘於心藏精神不安故卧不安則驚馬也

產經云真朱少許以水和塗腹良

葛氏方搗栢子人乳一升主飲之

千金方用服乱駁反

又方車轄肝肉口中膈中

又方燒帽皮三寸反看乳頭飲之

治小兒驚風方第九十四

病源論云小兒在胎時其母將養傷於風寒邪氣入胞傷

兒藏府故兒生之後邪獨在兒腹內邪動與正氣相搏

葛氏方搗栢子人參一刀圭飲之
千金方偏脹亂發反

又方車轄肝肉口中磨中
又方燒帽皮三寸反着乳頭飲之

治小兒驚風方第九十四

病源論云小兒在胎時其母將養傷於風寒邪氣入胞傷
兒藏府故兒生之後邪獨在兒腹內邪動與正氣相搏
則腹痛故兒驚張盛氣而啼也

千金方取新出馬矢一丸絞取汁含之

又方燒猪矢沸湯淋取汁浴之并与少許飲之

治小兒虎病方第九十五

病源論云虎病者復傷於日者至秋風邪乘之發也
未能觸胃於暑之病虎者是乳母抱持解脫不避風也
千金方生鹿角末煮先服一錢上

又方燒蟬甲偏脹寸匕至發時服三匕并大炙身

葛氏方臨發時搗大附子赤者偏塗肘上

又方石上冒蒲漚煮浴兒

今案集驗方桃葉二十七枚葉心上艾葉葉上十四枚

葛氏方恒山四分小麥三合淡竹葉切一升右以水

煮取一升服之

今案產經云此生冊餅日煮十日者五服或
至百日服二合半或至二百日一服三合

產經云師左半持水碗右持刀子正面於北兒曰北斗

七星主知一切死生之命屬北斗之君王也甲病虎

勿令流行誦三遍訖禹步就病兒前令視掌中師則

吐呵以其持刀刺掌中兒數急如律令勿令及顧

且秘驗過病後取刀子范注方同之

又法額面骨脊上皆筆作天公字骨上書作地

產後云師左半持水擦右柱下三寸處打

七星主知一切死生之命属北斗之君王甲病瘧

勿令流行誦三遍訖禹步就病兒前令視坑中師則

吐呵以其持刀刺坑中兒數急如律令勿令及顧

且秘驗過病後取刀子范汪方是

又法額面骨脊上皆筆作天公字骨上書作

太山之下有不流水上有神龍九頭九尾不食良餘物

正食瘧鬼朝食一千暮食五百一食不足遣我來

索瘧鬼聞之已罷走行千里用朱書之

治小兒傷寒方第九十六

產後云治小兒傷寒頭痛可

主為行六合竹歷六合

凡二物相不和者而三歲兒分三服

治小兒卒死方第九十七

葛氏方治小兒卒不知何所疾痛而不知人便絕死可

取雄雞冠血臨兒口上割令血出歷兒口喉使活

子母錢錄鹽湯極酸作服可取吐即活

范汪方焚馬矢一丸使取付吞兒下喉愈

治小兒住二方第九十八

病源論云住之言住也謂其邪氣留人身內也

千金方云取窻突中灰三指撮煖末分葶服之

治小兒數歲不行方第九十九

病源論云小兒生自變並至於能語隨日數五脈骨節

偷成其臍骨成則能行骨是髓之四者三石更

生血氣不充故其骨不厚成而數歲不能行也

千金方取喪家未用尸時盜取其骸以哺兒不過三

病源論云住之言住也謂其耶氣留人身內也

千金方云取寔突中灰三指撮煖末分等服之

治小兒數歲不行方第百九

病源論云小兒生自變並至於能語隨日數五脈骨節

偷成其骸骨成則能行骨是髓之所養也

生血氣不充故其骨不厚成而數歲不能行也

千金方取喪家未用尸時盜取其骸以哺兒不過三

日即行勿令人知之今案小兒方取東哺之日三便起

治小兒四五歲不語方第百

病源論云人之五歲有五聲脾之聲為言小兒四五歲

而不能言者內在胎之時其母平有驚怖內動於

兒藏耶氣乘其脾使脾氣不和故也

千金方灸足兩踝上三壯

又方末亦小豆和酒塗方下

治小兒無辜方第百一

病源論云小兒面黃髮直時壯熱飲食不生肌膚積經

日月遂致死者謂之无辜言天上有身名无辜晝

伏夜遊兒後小兒衣席露之任宿此身則飛後上過

而取此衣与小兒着并席与兒卧使令兒着此病也

崔侍御方以豬煮大黃末為丸服之甚驗

治小兒大腹下痢方第百二

病源論云小兒大腹下痢病者由哺食過度而脾胃

尚弱不能磨消故也其病腹大頸小黃瘦是也

葛氏方取生並根搗以猪膏煎服之

又方乾桑根定后伏翼定以哺之

蘇敬本草任云牛脂中毛燒服之

鉄駿方甘草十八分一物下研蜜和為丸一歲兒服如小豆

粒廿九日二三不食及乳服盡更合

治小兒霍亂方第百三

尚弱不能磨消故也其病腹大頸小黃瘦是也

葛氏方取生並根搗以猪膏煎服之

又方乾桑根定后伏翼定以哺之

蘇敬本草注云牛脂中毛燒服之

鉄驗方甘草十八分一物下篩蜜和為丸一歲兒服如小豆

粒廿九日二三不食及乳服盡更合

治小兒霍亂方第百三

病源論云小兒腸胃嬌弱同解脫逢風冷乳哺不消而

變吐利也或乳母觸胃風冷食生冷物時冷氣流入

乳飲之立成霍亂

牛乳灌口中一合也

又方熟牛矢汁含之

又方研屎滓乳上服之三刀圭日三

產後人參湯方

人參四分 厚朴二分 甘草二分 白朮三分

凡四物以水升二合煮取五合五升日兒一服合百日兒分三服

鉄驗方治小兒吐利方 亂後之方 鹿角一分 末末汁服之三刀圭

又方煮真梨葉服之

治小兒泄利方第百四

病源論云甚冷氣感利甚為洞下不止為注下

千金方炒倉米三服之

又方石榴燒末服一錢上日三

產後黃芩方

黃芩二分 干薑二分 人參二分

下篩蜜丸如大豆服三九日三

鉄驗方治小兒患利腹內不調方

薤白切七合 人參切八分 厚朴四分 粟三合

凡四物以水四升煮取二升稍飲之

又方石榴燒末服一錢上日三
產後黃芩丸

黃芩二分 干薑二分 人參二分

下篩蜜丸如大豆服三九日三

銀驗方治小兒患利腹內不調方

薤白切七合 人參切八分 厚朴四分 粟三合

凡四物以水四升煮取二升稍飲之

葛氏方下利不止方小豆和苦酒塗踐下

又方猪完炙噉之

本草拾遺云食菰為醬甚良

治小兒白利方第百五

病源論云凡利色青白黑皆為冷色黃赤是熱也

產後灸足內踝下腎陰三壯隨兒小大增減

子母秘錄云厚朴人參各四分

以醋漿半大升煮取二合分五服之

治小兒赤利方第百六

龍門方張子赤利方

薤白切三合 炙子七枚 香豉二合

水二升煮取六合分三服之

博濟安胎方薑青汁五合分服

治小兒赤白帶下方第百七

千金方搗石脂付服之

又方蜂房灰服之

又方鯉魚一頭燒末服之

又方燒骨末服之

提要方薤白一把 香豉升水三升煮取一升三服之

本草拾遺云鯽魚主水穀不調下利

又方掃小兒食之止下利

千金方搗石搗付服之

又方蜂房灰服之

又方鯉魚一頭燒未服之

又方燒骨未服之

提要方雁白一把香豉五升水升者煮取一升三服之

本草拾遺云鯽魚鱗主水穀不調下利

又方掃小兒食之止下利

產經云龍骨三兩研如末以水三升煮取一升五合服多少任意

又方大棗廿枚以水三升煮取二升去滓服之

子母秘錄云女子赤白利方年有兩可孕三兩以水一大升煮取五合飲之

產經治小兒血利血尿方

取生地黄汁升分四五服之

千金方藍青汁一合分四服之黃方在治血毒方中

治小兒大便不通方第百九

柯源論云小兒大便不通者府藏有熱乘於大腸故也

葛氏方取蜂房熬末以酒居水服少許

又方以白果五磨磨下至陰

治小兒小便不通方第百十

葛氏方取衣中白果五磨磨中內湯道中橫骨又佳也

又方取故席少許煮一升飲之

千金方車前子半升小麥一升煮為粥服之

又方葵莖子久在水四升煮取一升內滑石一分研服

子母秘錄治小兒尿不通方服之

効驗方

補苗滑石下篩服方寸匕日二

產經治小兒未滿十日煩不得小便方

燒蜂房服之

又方蒲黃一升以水和佳橫骨上良

子母秘錄治小兒尿不通符

聖書

唐下名
朱書
甚驗

効驗方

補黃

滑石

下篩以絹服方寸匕日二

產經治小兒未滿十日煩不得小便方

燒蜂房服之

又方補黃一升以水和塗橫骨上良

小品方治少小便秘不利至中痛欲死方

牛膝大把无多少煮作飲之立愈有驗

治小兒大便血方第百十一

大便血方

葛代方割鹿角作屑以米汁服五分匕

又方燒鵲巢為屑飲之廿許

大便竟出

千金方燒亂帶未塗乳飲之

又方燒車釐一枚赤肉一升水中分二服

信深方第根二把以水煎煮取半服之

治小兒血方第百十二

產經云雞骨溫酒服方寸匕

又方煮大麻根飲之

又方煮白茅根飲之多少任意

千金方燒鵲巢葉灰并煎水服之

治小兒淋病方第百十三

病源論云小兒淋者腎与膀胱契也其狀出小赴數小腹急痛引

座是也

千金方車前子一升水四升半煮取一升半分三服

又方滑石水煮服之又方蜂房乱髮分等燒末服

効驗方陳葵子一升水二升煮取一升分三服之

兩錢上

小品方煮實蒲黃三錢以上服方寸匕兒小以意稍服之有驗

產經治少小石淋方

蜂房一分 吳桂心一分

座是也

千金方車前子一升水四升半煮取一升半分三服

又方滑石水煮服之 又方蜂房乱髮分等煨末服

効驗方陳葵子一升水二升煮取一升分三服之

兩錢上

治少小淋瀝氣血不調大湯藥者

小兒方按實諸病從兒三歲以上服方寸匕兒小如意稍服之有驗

僧深方云車前子滑石方等治諸淋濁清和服半錢上

蜂房一分 桂心一分

凡二物治諸腫一刀圭以銅器承溺一与石俱出

治小兒遺尿方第百十四

病源論云遺尿者其由膀胱有冷不能約於水故也

千金方冬廬下一寸半施半粒

又方小豆葉楊汁服之

葛氏方取蔓草中葶燒服一錢上而晝

治小兒身黃方第百十五

病源論云小兒在胎其母藏氣有熱煙蒸於胎至生兒

時肝黃謂之胎疸

千金方楊五葉根汁之合服之

又方楊葉青汁服之

又方楊葉根汁條漏兒鼻口大豆許

治小兒身有赤瘡方第百十六

病源論云小兒因汗為風邪熱毒所傷与血氣相搏熱氣蒸

發於外其肉色赤而壯熱是也

千金方按實諸病從兒三歲以上服方寸匕兒小如意稍服之有驗

又方伏龍肝乱髮灰猪脂和塗之

葛氏方燒牛矢塗之

又方雞舒血塗之

治小兒腹皮青黑方第百十七

病源論云小兒因汗腠理則開而為風冷所乘搏於五臟

發於其肉色赤而壯契是也
治小兒身有赤瘡者方
千金方發米粉令黑蜜和塗之

又方伏龍肝亂髮灰猪脂和塗之
萬代方燒牛矢塗之

又方雞冠血塗之

治小兒腹皮青黑方第百十七

病源論云小兒因行膝理則用而為風令所乘搏於五隨

肌肉虛寒傷之則血氣沉滯不能榮其皮膚而風令客之

千金方桑落上下左右各去瘡半寸并鳩尾下寸三壯

又方盾和胡椒塗上若不愈治便更即死

治小兒赤瘡方第百十八

病源論云小兒有血氣不和肌肉變生赤逆條漸長大無定或

如錢大或圓三數寸今案小兒瘡佳有病源既治可

千金方搗艾肺中取血枯瘡上漸消

又方楊契矢塗之皮自卷落

產經雲胡椒和棗外向內塗之

又方屋塵臘月猪膏和付之

又方鍛鐵矢以猪膏付之

治小兒瘡瘍方第百十九

產經云治小兒身上瘡易方
石流黃以苦酒研之塗瘡上日三

又方生枯棗切開以驗苦酒三升煎取一升汁塗瘡上良

此是德家秘方不傳

治小兒疣目方第百廿

病源論云人有附皮膚生与肉色无異如麦豆大謂之疣子所

疣目也此多由風邪客於皮膚血氣變化所生故有之

藥治之老者更有法術治之老者而多生於手足

千金方以刀子決目根四面令血出取患瘡人瘡中黃膿

付之勿近水三日即膿潰根動自脫

治小兒疳目方第百廿

病源論云人有附皮肉生与肉色无異如麦豆大謂之
疳目也此多由風邪客於皮膚血氣變化所生故有
藥治之老者有法術治之老者而多生於手足
千金方以刀子決目根四面令血出取患瘡人瘡中黃膿

付之勿近水三日即膿潰根動自脫

產後以松脂塗臍上一宿即落良

又方以熨石棧臍上七過即去

又方艾炷山作可灸始生臍上三壯即自去良

又方月晦日於廁前取故草二十七枚棧目上訖祝曰今
日晦脫驚去勿又顧之不過十日枯死

今案俗人以赤莧汁付之即落或以煮苧布之汁洗之

治小兒身上瘡方第百廿一

切真艾又尺三寸生熟半之

千金方治小兒身上瘡方

取馬尿洗之日三四度

又方楷破以牛鼻津塗之

治小兒身熱方第百廿二

病源論云小兒血氣盛者表裏俱熱則煩燥不安皮膚熱
千金方米子蒸无多少吹咀以水煮去滓俗兒
治小兒身熱方第百廿二
今案小品方

獲敬本草注云梓白皮主小兒熱瘧身熱煩者煮湯浴

并散傳之
高氏方治小兒年身熱如犬不能乳哺方
急煎大耳取血以塗兒面及身也

本草拾遺云小兒果熱搗水芹取汁塗之

又方生銀小兒諸熱以水磨服切勝紫雪

治小兒盜汗方第百廿三

病源論云小兒盜汗者眠睡而汗自出也若將春過溫
目於膝下陰陽氣交津液散泄而
眼目汗自出也

葛氏方以干薑末一分粉三分合以粉之

小品方黃連三分貝母二分牡蠣二分

又方石膏一兩
煎黃二兩 蜜和如小
定服一丸

凡三物粉并合搗下篩以粉身

太平草拾遺云小兒果熱搗水芹取汁進之

又方生銀小兒諸熱以水磨服切勝紫雪

治小兒盜汗方第百廿三

病源論云小兒盜汗者眠睡而汗自出也若將春過溫
目於睡時陰陽氣交津液散泄而
眠汗自出也

葛根方以干薑末一分粉三分合以粉之

小品方黃連三分貝母二分牡蠣二分

又方石膏一兩
麻黃二兩 蜜和如
蜜服一丸

凡三物粉并合搗下篩以粉身

集驗方麻黃根三分故胡扇燒作屑一分

治合乳汁飲三分匕大人方寸匕日三

小品方同之

治小兒隱軀方第百廿四

病源論云小兒回汗而解脫衣裳風入腠理與血氣相搏

成之結聚起相連成隱軀風氣心在腠理浮淺其熱散故

千金方鹽湯極熱洗治隱軀使聚散之

不腫不痛但成隱軀瘰
耳

又方鹽沙水煮去滓洗之

產後云治小兒風極隱軀入腹身體腫脹治法干漆方主之

干漆
日三

治小兒丹瘡方第百廿五

病源論云風熱毒客在腠理熱毒搏於血莖發於外其皮上

熱而赤如瘰丹故謂之丹也若久不歇則肌肉爛傷也

產後云夫丹者惡毒之氣五也元常不即治轉壞肌完治之方

則去膿血或發於背解回多斷人四肢治之方
赤小豆作屑以甘草湯和進之

今案瘰驗方和麻油進之

又方麻湯大黃湯主之

瘰驗方取甘蕉根薄之立見腫少許汁

又方搗楸大草薄之 又方取白樹面傳之

千金方搗赤小豆和鷄子白塗之

又方牛天塗之

又方伏龍肝下篩鷄子白和付之

又方和油塗之

又方麻陽大黃湯主之

錄驗方取有蘆根薄之立見腫少許計

又方搗煨大草蓐之 又方取白蠟面傅之

千金方搗赤小豆和鷄子白塗之

又方牛天塗之

又方伏龍肝下篩鷄子白和付之

又方和油塗之

小品方水中苔搗付之

又方芷清肉湯中取十枚上

新錄方水若油研支子人搽之

又方生薑汁塗之

范汪方以生臭血塗之

蘇敬本草注匡鯉魚良

又方搗薤菜薄之

又方煮栗毛敷洗之

本草拾遺云鵝屎鋪主小兒大人丹毒

又云萍蠹水主小兒丹毒飲一合是打蠹桶中水也

烏小兒亦脫腫方第百廿六

源論云小兒有肌肉虛者為風毒熱氣所乘熱毒搏

於血氣則皮膚赤而腫赴其風隨氣行遊不定故名赤

游腫也

千金方凡小兒赤游行於頸上不治入腹而危治之方

用伏龍肝末和鷄子白塗之易之

葛氏方搗末研和粥付之

又方米粉熬熟和塗之

華佗方苦薑搗付之

治小兒身赤腫方第百廿七

病源論云小兒腫滿由將養不調腎脾二藏俱虛也其

水腫者皮薄如熟梨之狀若皮膚受風之搏而氣致

用伏龍肝末和雞子白塗之易之

葛氏方掃末研和粥付之

又方米粉熬熟和棗之

華他方苦薑梅付之

治小兒身疥腫方第百廿七

病源論云小兒腫滿由將養不調腎脾二藏俱虛也其

疾水腫者皮薄如熟梨之狀若皮膚受風搏而氣致

腫者但虛腫如吹此風氣腫也

產怪取香茅以水煮取汁以漬浴之良

又方赤山豆者大取汁漬浴甚良

千金方以小便溫漬之良

僧深方取鰾汁溫漬之汁味盡易

治小兒患疥腫方第百廿八

產怪治小兒患疥腫壯熱欲死麻湯方

升麻一兩

麻子半兩

沉香

藁本一分

丁子葉

凡五物切以水一斗五合煮取六合分三服一歲兒一服

半合隨兒大小增減水藥神驗

治小兒瘰癧方第百廿九

產怪云海藻頂方

海藻一斤切以酒二斗漬之稍飲之

治小兒諸瘰癧方第百卅

產怪云以大膏和胡椒磨創良

治小兒瘰癧方第百卅一

產怪云治小兒瘰癧瘰癧人年不冠海藻頂方

海藻一斤去鰾切好頂二斗漬脹二合日二三服盡滓

六作散服方寸匕

治小兒附骨疽方第百卅二

產怪云凡小兒有附骨疽者招杞裁近其身便大啼喚

產後之治小兒諸瘡
治小兒諸瘡
產後之治小兒諸瘡

治小兒瘰癧方第百廿一

瘰癧之治小兒瘰癧瘡久年不愈海藻煎方

海藻一斤去鹹切好酒三斗漬脹二合日三三酒盡滓

亦作散服方寸匕

治小兒附骨疽方第百廿二

產後之治小兒有附骨疽者招托裁近其身便大啼喚
即是文節有痛處或口支有不欲動搖如不隨狀

治之方初得即服漏蘆湯下之傳小豆蘆

治小兒癰疽方第百廿三

產後之治小兒癰疽毒者指與他指相似人不知不覺治其毒
入藏教人直審之癰疽者指端者其先作黑疤痛入心
也先刺指頭去惡血以艾灸七壯良

又方服犀角汁佳

又方服升麻汁

又方服葵根汁

又方服竹瀝汁

又方服豨薟汁

治小兒代指方第百廿四

產後之治代指者先腫飲熱色不黯也然後緣爪甲結

膿者脫爪也治之方

甘草湯熱漬之

又方芒消汁漬之

又方刺去血漬熱湯

又方以猪膏和鹽指甲固更而安若已膿者針去膿

治小兒疥瘡方第百廿五

病源論云饒至多變他所作其瘡裏有虫甚難見
小兒同乳養之人疥而得者

甘草湯契瘻之

又方荏苒付瘻之

又方刺去血瘻契湯

又方以猪膏和鹽指甲同炙而安若已膿者針去膿

治小兒疥瘻方第百廿五

病源論云瘻至多變他所作其瘻裏有田虫甚難見
小兒因乳養之人疥而得者

六全不燒竹葉末和鷄子白付之目二

又方糲和胡粉塗之

又方亂髮灰和臘月猪脂付之

產後蜀椒五合末以水一斗煮三沸去滓溫湯浴良食頃良

治小兒癰瘻方第百廿六

食頃良若痒不止復漬之

病源論云癰瘻由風邪與血氣相搏為癰小兒面

上生癰謂之為乳癰言乳汁積滯兒面而生仍以

乳汁洗之便矣

產後凡癰不指破上皮膚而藥瘻者不

用黑毛牛天溫洗之良

又方未批白皮以苦酒和瘻之

又方胡椒末令黃芩和酢瘻上焯腹瘻良

千金方批青皮搗和酢瘻之

又云乾癰方芍把根搗以猪脂和付之又以醋和佳

集驗方以水銀合胡椒傳之

又方蛇床子末和白膏傳之

治小兒浸淫瘻方第百廿七

病源論云小兒五藏有熱外為風濕所折發瘻

千金方竈中五二分煖灰一分末下猪脂和付之

產後取牛矢便取汁瘻之

又方以干牛天燒煙良

集驗方以水銀合胡粉傳之

又方蛇床子末和白膏傳之

治小兒浸淫瘡方第百廿七

病源論云小兒五藏有熱外為風濕所折發瘡

千金方竈中五二分發灰一分末篩猪脂和付之

產後取牛矢取汁塗之

又方以干牛天燒煙良

又方胡鷲葉末和水傳之

治小兒癩瘡方第百廿八

病源論云癩者風濕搏於血氣所成多著手足背腕面

百廿九 癩之瘡痛浸淫生長呼之為癩以其瘡有

細虫如蠅虫

產後治小兒大人蝸疥百療不羗方

地榆五兩

練實五兩

桃皮五兩

苦參五兩

凡四物以水一斗煮取五升溫洗良並治癬

又方穀穗白皮一合

治小兒王初瘡方第百廿九

病源論云府藏有熱熏皮膚外為濕氣所乘則

變生瘡其熱偏盛者其瘡發之盛初生如麻子

須臾王大汁流潰爛如湯大所灼故名王初瘡

千金方小兒王初瘡者一身盡有如麻子小豆者戴勝

汁出者痛下痒下熱方

又方桃人熟搗和面脂塗之

又方牛屎灰付之

又方燒艾灰付之

黃連 胡粉

右二物治下疳分等以麻油和塗之

治小兒月食瘡方第百卅

病源論云小兒耳鼻口角生割謂之月食割其瘡隨

又方桃人契搗和面脂塗之

又方牛屎灰付之

又方燒艾灰付之

產後治小兒黃爛瘡方

黃連 胡粉

右二物治下篩分等以麻油和塗之

治小兒月食瘡方第百卅

病源論云小兒耳鼻口面生創謂之月食創其瘡隨

月生死因以為名也世云小兒見月初生以手指之

則令耳下生創故呼為月食瘡也

千金方治小兒月食瘡方和胡椒塗之 又三月餘九竅皆有者方

又方燒蚯蚓金末和膏付之

葛氏方以五月五日蝦蟇屑和膏付之

產後取薤麻草汁塗上

又方劉槐枝煮取汁洗之

龍肉方猪脂和杏仁付之

徐之才方小藥皮搗為末付之

治小兒凍瘡方第百卅一

病源論云小兒冬月為寒氣傷於肌膚寒氣搏於

血氣之壅滯同所生創其創嫩腫而難是乃至皮肉

爛謂之為凍瘡創

產後云小兒冬月涉水凍手足瘡瘡壞疼痛方

取麥糠煮熱洗瘡之

又方櫟木灰和漿湯洗之良

千金方生胡麻搗膏之

治小兒漆瘡方第百卅二

病源論云人無問男女大小有稟性不耐漆者見漆及新漆便

著漆毒令頭身面腫起隱癢色赤生瘡癢痛是也

治小兒漆瘡方第百卅三

取麦糠煮熟洗漬之

又方搗木灰和漿湯洗之良

千金方生胡麻搗傅之

治小兒漆瘡方第百卅二

病源論云人無問男女大小有稟性不耐漆者見漆器便

著漆毒令頭身面脚腫起隱癢色赤生瘡癢痛是也

治小兒乳癰方第百卅三

又方芭蕉石槌石一著塩湯中令消以洗之

又方煮柳葉洗之

又方搗薤白塗之

治小兒蠅螬傷瘡方第百卅三

千金方搗梨葉薄之

又方搗桑葉煎漿和付于易

產經云初得便以麻角水磨塗上

又方麻角燒末苦酒和傅上

又方山豆屑苦酒和傅之

又方大麥飯甗傅上

又方胡椒以生油和塗之

治小兒惡瘡久不愈方第百卅四

病源論云夫身生瘡時是感熱衝外有風濕

相搏所生而有狹毒者其創久不愈名為惡瘡

產經燒地貳末以猪膏和傅之

又方豉末末傅上

集驗方院其文祿取汁浴兒勿令兒及女知大良

葛氏方燒乱髮并全月下五猪膏和傅之

又方梁上塵傅之

又方黃連胡粉水銀末和傅之若瘡燥和猪肪

產經燒地既未以猪膏和傳之

又方金匱傳方發熱未傳上

集驗方院其文祿取汁浴兒勿令兒及母知大良
葛氏方燒乱髮并金月下五猪膏和傳之

又方梁上塵傳之

又方黃連胡粉水銀末和傳之若瘡燥和猪肪
傳之

隨時方取桑樹孔中水洗之五老

范汪方燒雞屎付之

本草拾遺云廁中泥傳之

治小兒金創方第百卅五

病源論云小兒為金刃所傷謂之金創

產經云以寬反付創中

又方馬矢燒未著創中

又方燒綿未著創孔中

又方燒青布相他傳之

今案按地蒜付之

治小兒湯火灼瘡方第百卅六

千金方燒煮大豆濃汁溫塗之無二燈

又方白蜜塗日十遍

傷經方千金反之
今案經云當以蜜
冷水飲之

今案經心方以蜜解冷水飲之

產經石膏末付之五

又方桑灰水和付之

治小兒竹木刺方第百卅七

產經治小兒竹木刺及針不出方

燒鹿角末水和塗創口立出不過二日良

又方生牛膝根搗傳創口令自出

今案經心方以蜜角為小兒之

產後石膏末付之五

又方來灰水和付之

治小兒竹木刺方第百廿七

產後治小兒竹木刺及針不出方

燒鹿角末水和塗創口立出不過一夕良

又方生牛膝根搗碎創口令自出

又方醫白梅為梅傳之水和解之

又方王不留行曬麥陳在服方寸七日自出

治小兒落床方第百廿八

葛代方治小兒落床墮地腹中有瘀血恆契不欲乳哺

歸寧方

大黃

黃連

蘇黃

各

芒硝

一分半

以水二升煮取一升去滓內芒硝分二三服當大下便去

五

產後用之

治小兒食不知飽方第百廿九

病源論云小兒有嗜食已仍不知飽是又不生肌肉之腹大

其大便數而多此脾胃不守故也

千金方治小兒食不知飽方

鼠矢二七枚燒末服之

治小兒吐食方第百三十

千金方取突一斤繩繫曳地行數里勿洗大炙散之良

治小兒吐五方第百三十一

病源論云小兒吐五者是有寒氣盛而虛熱乘於血

性得熱則風散妄行氣逆逆隨氣上故吐也

千金方油三分酒一分和月再服之

治小兒咳嗽方第百三十二

病源論云小兒咳嗽由乳哺无度月狹風冷傷於肺故

也

治小兒吐瀉方第百五十一

病源論云小兒吐瀉者是有寒氣盛而虛熱乘於血性得熱則風散妄行氣逆益隨氣上故吐瀉也千金方油三分酒一分和日再服之

治小兒咳嗽方第百五十二

病源論云小兒咳嗽由乳哺无度月狹風冷傷於肺故也

產經治少小十日以上至五十日卒得咳嗽乳飲停不乳方

牡桂三分 甘草十分 紫苑三分 麥門冬七分

凡四物以水二升煮取半升以綿署湯中漉兒中服之晝夜過

之師乳哺

千金方燒淡竹瀝煮十沸小兒一服一合日五大人一升日五

余案大素丸九驗其方在湯丸卷大人方

張文仲方云孩子咳嗽宜与乳母藥方

竹葉切一升 石膏碎乳香各二兩 貝母三兩

紫苑百部根 各二兩 石六物切以水八升煮取

二升分三服但乳母林食蒜麵

新錄方治小兒嗽方

飲服紫苑末

儒深方云款冬花丸治小兒咳嗽方

款冬花方 紫苑方 桂心方 伏龍肝方

右四物下篩蜜和如棗核吞乳以日三夜二今

以大素丸治之尤驗其方在大人方中

治小兒食寒骨瘦方第百五十三

產經以大刀鐮磨喉二七過良

儒深方云數冬花丸治小兒疳積方

款冬花方 紫花膏 桂心膏 伏龍肝膏

右四物下篩蜜和如棗核黍乳以日三夜二今

以火素丸治之尤驗其方
在大人方中

治小兒食寒骨瘦方百五十三
產經以大刀鐮磨喉二七過良

又方燒無骨末水飲良
又方仍取投地室骨者

又方燒麝香末以水服之即出
耳上目睛赤者即出

治小兒食完骨瘦方百五十四

產經狸骨末服方寸匕良

又方取雄雞左右翅大毛各一枚燒末服一刀圭

治小兒食草芥便方百五十五

產經以好蜜少和之

又方未曬麥服方寸匕

又方猪膏如鷄子吞之不去復吞兩三過良

治小兒飲李梅漿便方百五十六

產經以水灌兒頭上取汁與飲之良

治小兒食飯繞咽方百五十七

產經取梳頭段燒末服一錢上

治小兒誤吞錢方百五十八

產經楊皮服方寸匕

又方服蜜二十即出

又方艾一把以水五升煮取升頓服之立下

治小兒誤吞針方百五十九

千金方吞落石末大盡出

產經以多食脂膏及諸肥物自裹出之

治小兒誤吞鈎方百六十

產經以治小兒誤吞鈎鈎端着在手中莫引之方

又方服蜜二十匙也

又方艾一把以水五升煮取升頓服之立下

治小兒誤吞針方第百五十九

千金方吞落石乘大蠶出治小兒誤吞針方今案產後少腹之

產後多食治小兒誤吞針方脂定及諸肥物自裹出之

治小兒誤吞鈎方第百六十

產後云治小兒誤吞鈎鈎端若在手申莫引之方

以珠若薏苡子貫著繩稍推令至鈎處少引之

治小兒誤吞又方第百六十一

產後取菲治小兒誤吞又方令其吞食多食大東

又方多食白糖自隨出之

治小兒誤吞銀方第百六十二

產後燒鷹羽數枚末服之家一所養鴉羽之可用之

治小兒誤吞竹木方第百六十三

產後取布刀故鋸燒條屑中以女人大指爪二枚燒末

內酒中飲之良

醫心方卷第廿五

復水鏡前云治小兒瘡於大人異

治大丹方

蕎麥麵

黃塩各少許水銀

牛乳各少許

右同研令極細塗之便見

治赤斑之瘡方

五龍子一條

赤土壹少許

牙屑

六分

薰陸香

少許

無以醬金代之

右物細研以新汲井水調灌之立見

治燒豆瘡方

乾漆

炒新煙

人中白

瓦松灰

各少許

馬牙屑

一分

右並研令細空心冷漿水調一錢溫服之取吐為度吐了

治赤斑瘡方

五龍子一條 赤土^{少許} 牙屑^{六分} 薰陸香^{少許}

無以磨金代之

右物細研以新汲井水調灌之立見

治豌豆瘡方

乾漆^{炒新煙} 人中白^{瓦松灰} 各^{少許} 馬牙^屑

右並研令細空心冷漿水調一錢溫服之取效為度也

又服一錢利三五行其瘡自落

治小兒急疳痢瀉不止或膿或血或青或黃或作種或

頭髮墜落鼻乾喉嚨乾皮癢臂云金髓散方

黃連一兩宣州者為末用鷄子一介取清和連末

作餅子炙焙石中黃一分 烏餘糧 麝香

朱砂^{各少許} 香頭二介^个 生去脂尖肉 豆蔻^个

訶子二介^个 去核 金牙石一分

右件物並為散空心以米飲下一歲兒一字五歲一錢

忌熱物

治小兒紫疳面模黑色身上或生青斑紫斑鼻内生瘡

腮陷手背脚背虛腫不脫肛不脫胎胎毒發紅

竹天黃丸方

天竹黃一分 朱砂一分 巴豆一粒去皮心

膜麝香^{少許} 麝香^{少許} 香頭一顆生去脂尖

右五味俱研為末以蠟酥為丸如黃米大一歲兒一

九空心溫米飲下如嬰兒乳汁下

忌熱麵毒食及一切熱物忌冷物